




Transi'marsh Fonctionnement du troupeau



Reproduction

50 mises à la reproduction, dont 16 génisses
=> 40 à 50 naissances / an

Résultats 2018-23

Performances similaires entre les 2 saisons de vêlage

Réduction de l'effectif
entre 2018 et 2023
mises à la repro 64 → 49
naissances 58 → 43

Objectif NEC minimale de 2,5
à la mise à la reproduction

Moyenne Mini-maxi	NEC à la repro	Rang de vêlage	Nb veaux morts	% taux de productivité	Vêlages aidés	PAT120 (kg)
Vêlages de Printemps	2,55 2 - 3	4,7 1 - 13	1,5 0 - 3	91,8 84 - 97	0,2	154 123 - 186
Vêlages de Automne	2,40 1,5 - 3	3,9 1 - 11	1,5 0 - 4	80,6 77 - 85	0,2	153 105 - 194
Ensemble troupeau	2,48 1,5 - 3	4,3 1 - 13	3,0 0 - 6	86,2 77 - 97	0,3	154 105 - 194

Ventes régulières et variées



2 saisons de vêlages : mars et septembre
Ventes réparties toute l'année, avec 2 pics : mars-mai + sept-nov
En 2024 : 11 vaches et
26 veaux-broutards (dont 22 viande rosée)

■ Augmentation de la diversité d'acheteurs avec accroissement des ventes directes dont restauration collective

■ Arrêt des ventes de broutards pour export

- MN Maigre Négociant
- MER Maigre Eleveur Reproduction
- MEE Maigre Eleveur Engraissement
- VF Ventes filières
- VD Ventes directes

- AB Agriculture Biologique
- CCP Circuits Courts de Proximité



Alimentation à base d'herbe, pâturage et/ou foin.

Au printemps pâturage exclusif, en été affouragement au champ : foin de prairies naturelles (PN)

En hiver en stabulation : foin de PN+ complément d'un méteil : 1kg / animal / jour

Vaches suitées : foin de PN + foin de luzerne + complément (2kg)

Engraissement des réformes : foin de PN + foin de luzerne + complément (4kg)

[enrubanné de méteil certaines années]

+ Test d'engraissement long : après le sevrage de leur dernier veau, vaches nourries uniquement à l'herbe et au foin, pendant un an minimum.


Calendriers de pâturage

Nombres de jours (mois)	Moyennes 2017-23	Mini	Maxi
Durée hivernage	138 (4,5 mois)	117 2020-21	175 2017-18
Durée pâturage strict	124 (4 mois)	77 2018	163 2021
Durée affouragement	102 (3,3 mois)	59 2023	123 2022

Mises à l'herbe entre le 17 mars (2021) et le 24 avril (2018)
Début d'affouragement entre le 10 juillet (2018) et le 6 sept. (2023)
Entrée en stabulation entre le 11 octobre (2017) et le 12 déc. (2022)

Veaux au pis, accès libre à l'herbe (pâturage ou foin), pas de complément

Quantités d'aliments consommés en tonnes par an



Réduction du troupeau, de l'emploi de l'enrubanné de méteil et accroissement de la luzerne

Pas d'autonomie pour la litière

Litière consommée, produite et achetée en tonnes par an (moy 2018-23 ; min-max)

	2018-2023	Consommé	Produit	Acheté
Paille		102 26 – 163	15 0 - 26	87 0 - 163
Roseaux		24 0 - 67	0	24 0 - 67

Stratégie de vente

Objectif vaches : EG carcasse 3 => NEC abattage 2,5 à 3 -- **NEC atteinte pour 94 % des vaches (sur 111)**

Objectif veaux : satisfaire des commandes
vente de mâles et de femelles

Calendriers des ventes directes calé sur les veaux cantines + alternance avec vaches

Critères de réforme :

1. comportement
2. accidents de reproduction
3. taille des mamelles
4. âge

Carcasses adultes (248 vaches et bœufs) :

90 % ont un EG de 3

70 % classées R ; 25 % classées O

Carcasses veaux (152 M et F) :


70 % ont un EG de 2 (12 % un EG de 1)

54 % classées R ; 32 % classées O

Moy 2009-2024 (min-max)	Poids carcasse	Rendements carcasse
Bœufs (n=71)	453 (364 – 590)	55,24
Vaches >3 ans (n=121)	354 (206 – 439)	52,15
Veaux mâles 6-8 mois (n=47)	142 (99 – 183)	58,6

Rendements fourragers


Récoltes annuelles en tonnes de matière sèche



Rendements en tonnes de matière sèche par ha



Type de couvert	Moy 2017-24	Min. à la parcelle	Max.
Foin - Luzerne par coupe	2,3	0,8	6,5
Foin - Prairie naturelle	3,9	0,9	7,0
Enrubannage - luzerne	4,5	2,8	6,1
Enrubannage - Méteil	4,6	1,6	6,8

Rendement des prairies naturelles en tonnes de MS / ha



Qualité des fourrages

Fourrage	Type_couvert	MAT	UFL
Enrubannage	Luzerne	9,4	0,71
	Méteil	10,8	0,7
Foin	Luzerne	16,0	0,63
	Prairie naturelle	6,3	0,61
	PN Normandie	9.2	0.74
	PN moy montagne	9.2	0.71




Contrôle laitier



Élevage bovin viande
de Race Maraîchine
en Agriculture Biologique

Moyennes 2018-2023

Vêlages d'automne
33 vaches différentes
84 lactations





Moyenne Mini-maxi	GMQ des veaux (gr / jour)
Vêlages de Printemps	983 294 - 1496
Vêlages de Automne	941 527 - 1222
Ensemble troupeau	963 294 - 1496

	Kg lait par jour
Moyenne	7.62
Primipares RV 1	6.05
Multipares RV 2 à 4	7.90
Multipares RV 5 à 9	8.15
Multipare RV 10	5.85

Poids à l'abattage des bovins

360 bovins abattus à plus de 2 ans



Poids à l'abattage des veaux

125 veaux abattus entre 4 et 10 mois

